



AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
CAGLIARI
SSD di ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Direttore Dr. Pier Paolo Carreras
Tel. 070 539538

Sig..... nat a..... il.....

CONSENSO INFORMATO ALLA SEDAZIONE COSCIENTE

Si intende quella sedazione per la quale l'utente è capace indipendentemente e continuamente di mantenere il controllo del respiro, rispondere agli stimoli tattili e cooperare ai comandi verbali, ottenendo la riduzione dell'ansia, dell'agitazione psicomotoria.

N.B. SI ESEGUE SOLAMENTE SE IL PAZIENTE E' ACCOMPAGNATO !

Perché viene fatta?

Gli obiettivi della sedazione in endoscopia sono quelli di cercare di ridurre ma non di eliminare il disagio per il paziente.

Come si ottiene?

Le benzodiazepine più comunemente impiegate per la sedazione cosciente in endoscopia digestiva sono il diazepam (Valium) e il midazolam (Ipnovel).

L'una o l'altra viene somministrata per via endovenosa in piccole dosi frazionate sino al raggiungimento della sedazione desiderata.

In associazione ad esse possono essere utilizzati farmaci analgesici e/o oppioidi.

Quali sono le complicanze?

La sedazione cosciente può essere gravata, come qualsiasi atto medico, da complicanze quali: isolati casi di broncospasmo e reazioni allergiche: problemi cardio respiratori come l'alterazione della pressione arteriosa, della frequenza e del ritmo cardiaco; nausea, depressione respiratoria, apnea, arresto respiratorio e/o cardiaco, che in alcune ancor più rare circostanze potrebbero risultare pericolose per la vita.

Inoltre si possono avere dolore nel punto di iniezione e tromboflebiti.

L'utente dovrà astenersi dalla guida di autoveicoli e dall'impiego di macchinari potenzialmente pericolosi, nonché dall' eseguire lavori impegnativi o assumere decisioni legali nelle 24 ore successive all'esame endoscopico e potrà lasciare l'ambulatorio solo se accompagnato.

Accenso alla sedazione cosciente.....